

(2) 予防接種を受けることができない人

① 明らかに熱のある人（通常、体温が37.5度以上ある人）

② 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人

③ ワクチンの成分により、アナフィラキシーを起こしたことがある人

通常、接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。発汗、顔が急にはれる、全身にひどいじんましんが出る、吐き気、嘔吐（おうと）、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続き、血圧が下がっていく激しい全身反応です。

④ インフルエンザの予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられた人、又は全身に発しん等のアレルギーと思われる症状が現れたことがある人

⑤ その他、医師が不適當な状態と判断した人

(3) 接種を受ける前に、医師とよく相談しなくてはならない人

① 心臓病、じん臓病、肝臓病やその他慢性の病気で治療を受けている人

② 今までにけいれんを起こしたことがある人

③ 免疫不全と診断されている人、又は先天性免疫不全症の家族がいる人

④ 間質性肺炎、気管支ぜん息と診断されている人

⑤ 予防接種の成分又は鶏卵、鶏肉、その他の鶏由来のものに対して、アレルギーがあるといわれたことがある人

6 受けた後の一般的注意事項

① 予防接種を受けた後の30分間は、急な副反応が起きることがあります。医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。

② 副反応の多くは24時間以内に起こるので、体調に注意しましょう。

③ 入浴はかまいませんが、注射部分を強くこすことはやめましょう。

④ 接種当日はいつも通りの生活をしてかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。

※ 予防接種を受けた後、副反応と思われる症状が現れたら、医師の診察を受けてください。

そのほか、ご不明な点は下記へお問い合わせください。

《お問い合わせ先》

瀬戸市健康課 電話 85-5065 Fax 85-5120

尾張旭市健康課 電話 55-6800 Fax 53-9488